




KABANEK GREEN DRY

Siła kwasów SCFA i MCFA.

JAK TO DZIAŁA? — PODWÓJNA STREFA OCHRONY



STREFA 1: Trawieniec i jelito cienkie

Kwasy SCFA (mrówkowy, fumarowy, propionowy, octowy):

- Szybkie obniżenie pH treści pokarmowej
- Lepsze ścinanie kazeiny mleka (zapobiega gniciu)
- **Cel:** Bakterie Gram-ujemne (**E. coli**, **Salmonella**)

STREFA 2: Dalsze odcinki jelit

Kwasy MCFA (C8 kaprylowy, C10 kaprynowy, C12 laurynowy):

- Docierają głębiej, niszcząc błony patogenów
- Wspierają rozwój kosmków jelitowych
- **Cel:** Gram-dodatnie (**Clostridium**, **Streptococcus**) + **E. coli**

Korzyści z regularnego stosowania

Mniej biegunk pokarmowych

Redukcja presji patogenów w krytycznym okresie odchovu cieląt.

Szybszy rozwój przedżołądków

Stymulacja brodawek żwacza dzięki obecności kwasu propionowego i masłowego.

Wyższe przyrosty dobowe

Lepsze trawienie i wykorzystanie paszy starterowej (prestarter).

KABANEK GREEN DRY: Bezpieczny start w dorosłość



KABANEK GREEN DRY

Postać: sypka (proszek) | Opakowanie: worek 25 kg

Skoncentrowana mieszanka buforowanych kwasów organicznych i destylowanych kwasów tłuszczowych. Wspiera higienę paszy, stabilne pH oraz prawidłowe trawienie u bydła i małych przeżuwaczy.

DAWKOWANIE (ZWIERZĘ / DZIEŃ):

Grupa zwierząt	Dawka / szt. / dzień
Krowy mleczne	40 - 60 g
Bydło mięsne	20 - 40 g
Cielęta hodowlane (cielęta, jałówki)	5 - 10 g
Małe przeżuwacze (kozy, jagnięta, owce)	3 - 8 g

Zakres orientacyjny; dawkę końcową dobrać do pobrania paszy i masy ciała.

Kiedy włączyć do programu zdrowotnego?

Pasza starterowa:

Od pierwszych dni wprowadzania paszy stałej dla wsparcia żywca.

Okres odsadzenia:

Wsparcie w momencie stresu i zmiany diety z mlecznej na stałą.

Problemy trawienne:

Jako wsparcie przy występowaniu nawracających biegunk pokarmowych.



Dystrybutor: NATURAL-PIG Sp. z o.o.
Osówka 85B, 09-304 Lubowidz
Wet. Nr Ident.: PL1437045p

Miejsce na pieczęć /
wizytówkę doradcy